WWW.DOBASENU.PL
CHEMIA BASENOWA TECHNIKA BASENOWA
SERWIS BASENOWY
tel.; 94 71 79 120
mobile: 609 393 012
Infolinia: 801 011 329
fax.: 94 71 79 121

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:03

Link do produktu: https://dobasenu.pl/chlortix-multi-tabletki-20g-multifunkcyjnosc-wolno-rozpuszczalny-1kg-5kg-45kg-p-6.html



CHLORTIX MULTI TABLETKI 20G - MULTIFUNKCYJNOŚĆ - WOLNO ROZPUSZCZALNY 1KG / 5KG / 45KG

Cena	**86,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**0028**
Kod producenta	**0028**

Opis produktu

Skład:

1000 g produktu zawiera 970 g substancji czynnej - symklosen CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8 [zaw. aktywnego chloru min 800 g], siarczan miedzi, siarczan glin, kwas borowy

Postać preparatu:

Preparat w postaci stałej; występuje w postaci: tabletek

Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy, grzybobójczy - do dezynfekcji wody basenowej.

Działanie:

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus
- Enterococcus hirae
- Legionella pneumophila
- Candida albicans
- Aspergillus niger

Sposób użycia:

- Dezynfekcja wody basenowej

- Baseny z automatyczną stacją dozującą

W przypadku skażenia wody basenowej jednym z poniższych szczepów bakterii dozować produkt w następującym stężeniu: Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); Escherichia coli - dawkowanie 2 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h);

Enterococcus hirae (paciorkowiec) - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h);

Pseudomonas aeruginosa (ropa błękitna) - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h);

Legionella pneumophila - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h).

Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 5 mg/l. Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h.

Podczas całego procesu wartość pH powinna być utrzymywana w przedziale 6,9-7,2.

Po procesie dezynfekcji pozostałości wolnego chloru powinny być zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

- Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody przeznaczonej do spożycia należy doprowadzić pH do poziomu 6,9-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomiernie mieszanie wody - zastosować 65 g preparatu ChlorTix Multi na 10 m^3 wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 24 h).

Np.:

7 tabletek o gramaturze 10 g lub

4 tabletki o gramaturze 20 g.

1 tabletka 100 g wystarcza na uzyskanie efektu bakteriobójczego w 15,3 m^3 wody

Tabletki 200 g. zaleca się stosować do basenów o większej pojemności. 1 tabletka 200 g wystarcza na uzyskanie efektu bakteriobójczego w 30,6 m^3 wody.

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zużycie chloru w wodzie basenowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zaleca się po 3 dniach dodać 30 g preparatu ChlorTix Multi na 10 m^3 wody.

Preparat ChlorTix Multi można dawkować bezpośrednio za pomocą skimera lub pływaka dozującego. Zaleca się również sposób dozowania za pomocą śluzy dozującej. Nigdy nie należy dozować preparatu bezpośrednio do basenu. Grozi to miejscowym odbarwieniem folii basenowej.

Po procesie dezynfekcji pozostałości wolnego chloru powinny być zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WAGA: 1KG , 3KG , 5KG , 45KG